

## Prevencción

### Tener en cuenta que todos los mamíferos son susceptibles

- Cuando se encuentre un animal enfermo no introducir la mano en la boca.
- Limpiar bien la herida con agua y jabón.
- Reunir información sobre el animal.
- No tocar murciélagos.
- No espante o mate murciélagos sin dar aviso al MGAP.
- En caso de ser mordido por un perro se debe hacer la denuncia al MSP.
- Control médico.
- Vacunar al personal de riesgo: veterinarios, laboratoristas.
- Tenencia responsable canina (carné de vacunas, entre otros).
- Otras según situación.

#### Período de incubación

3 semanas a 6 meses

**La vacuna neutraliza el virus antes que llegue al cerebro.**

Es un mensaje de:



**Comisión  
Zoonosis**

Al servicio de la gente  
y los animales

Br. España 2673, Montevideo  
Tel: 2709 9258  
educacionzoonosis@gmail.com  
secretariazonosis@gmail.com



# Rabia

## Es una zoonosis

Se transmite  
de los animales al hombre

## La produce un virus

### Agente transmisor:

la saliva del perro y por murciélagos principalmente. También por gatos, zorros, zorrinos entre otros.

# Rabia

Los animales silvestres también pueden contraerla



## En perros y gatos se manifiesta por:

- Deja de alimentarse.
- Se vuelve agresivo.
- Tiene salivación.
- Muere en 3 o 7 días.



## En vacas, caballos, ovejas y cerdos:

De los 2 o 3 meses pueden manifestarse los síntomas:

- Deja de comer y se aísla.
- Salivación y parálisis del tren posterior.
- Muere a los 7 días.



## En zonas rurales el principal vehículo transmisor es el murciélago

El ser humano



Se contagia por la saliva del animal enfermo



Por mordida, arañazo o penetración por herida



La penetración del virus siempre va al sistema nervioso central.

Si el lugar de entrada es la cabeza, cara, cuello o miembros superiores la incubación es más rápida