

Prevenición

- Ventilación de lugares cerrados (por lo menos 30 minutos).
- Mantener corto (al ras) las malezas y pastizales.
- Escombros, leña y otros elementos apilados por lo menos deben estar a 30 metros de la casa.
- Manejo correcto de la basura (enterramiento).
- Control médico periódico.



Es un mensaje de:

**Comisión
Zoonosis**

Al servicio de la gente
y los animales

Br. España 2673, Montevideo
Tel: 2709 9258
educacionzoonosis@gmail.com



Hanta Virus

Es una zoonosis

Se transmite
de los animales al hombre

La produce un virus

Agente transmisor

el ratón silvestre.

Hanta Virus

La transmisión se efectúa por

- Respirar aire contaminado
- Ingerir alimentos contaminados
- Contacto con excrementos de ratones
- Tocar objetos (herramientas) contaminadas
- Ser mordido por ratones



El ratón silvestre posee el virus.

Contamina el ambiente con su orina, heces y saliva.

El ser humano contrae la enfermedad al aspirar el virus (vía respiratoria)

La enfermedad evoluciona en 3 fases:

- Incubación, sin síntomas;
- Inicial, síntomas similares a la gripe con fiebre, dolores de cabeza, musculares y huesos;
- Compromiso respiratorio. Complicaciones en corazón y pulmones.

¿Quiénes corren riesgo?

- Trabajadores agrícolas, forestales y de aserraderos.
- Personas en campamentos.